

Fragebogen zur Aktivitätsbestimmung bei Morbus Crohn

Der **Crohn's Disease Activity Index (CDAI)** setzt sich aus acht Faktoren zusammen, die jeweils mit einem Faktor der Gewichtung multipliziert und dann summiert werden:

Item	Ihre Angaben	Gewichtungsfaktor
Anzahl ungeformte Stuhlgänge in den letzten 7 Tagen		x 2
Schmerzen in den letzten 7 Tagen (=keine, 1=leicht, 2=mittel, 3=stark)		x 5
Gemeinbefinden in den letzten 7 Tagen (=gut, 1=beeinträchtigt, 2=schlecht, 3=sehr schlecht, 4=unerträglich)		x 7
Komplikationen (pro Komplikation Punkt)		x 20
<ul style="list-style-type: none"> • Gelenkbeteiligung • Augenbeteiligung (Iritis, Uveitis) • Hautbeteiligung (Erythema nodosum, Pyoderma gangraenosum, Aphthen oral) • Perianaler Befall (Analfissur, perianale Fistel oder perianale Abszesse) • Andere Fisteln • Erhöhte Körpertemperatur in den letzten 7 Tagen (>37,7 °C) 		
Asymptomatische Steroidbehandlung		x 30
Dominante Resistenz (=nein, 2=fraglich, 5=sicher)	Wird durch uns bestimmt	x 10
Abweichung des Hämatokrits von 42% bei Männern und 42% bei Frauen	Wird durch uns bestimmt	x 6
Abweichung vom Standardgewicht in %	Ihr Gewicht:	x 1

Die Remission bei Morbus Crohn ist definiert als CDAI < 150.