

Aktivitätsbeurteilung bei Colitis ulcerosa

Der **Mayo-Score** beinhaltet klinische sowie endoskopische Charakteristika:

Kriterium	Ihre Angaben	Punkte
Stuhlfrequenz pro Tag		<ul style="list-style-type: none"> • normal: 0 • 1-2 Stühle: 1 • 3-4 Stühle: 2 • > 5 Stühle: 3
Rektaler Blutabgang		<ul style="list-style-type: none"> • kein Blut: 0 • Blutstreifen bei weniger als 50% der Stühle: 1 • Deutliche Blutbeimengung meistens: 2 • Auch Blut ohne Stuhl: 3
Endoskopischer Befund	Wird durch uns erhoben	<ul style="list-style-type: none"> • normaler Befund oder inaktive Erkrankung: 0 • milde Colitis (Erythem, leicht spröde Schleimhaut): 1 • moderate Colitis (deutliches Erythem, Erosionen, Gefäßmuster verschwunden): 2 • schwere Colitis (Ulzerationen, spontane Blutungen): 3
Globale Beurteilung des Arztes	Wird durch uns erhoben	<ul style="list-style-type: none"> • normal: 0 • milde Erkrankung: 1 • moderate Erkrankung: 2 • schwere Erkrankung: 3

2 bis 5 Punkte entsprechen einer milden, ab 6 Punkte einer moderaten bis schweren Erkrankung.